

## PENETRACIÓN ANAL

La penetración anal siempre produce microlesiones (en el ano y en el pene) y supone un alto riesgo de transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). El VIH está presente tanto en el semen como en la sangre, por tanto la transmisión del VIH puede ocurrir sin que exista eyaculación por la presencia de sangre. El riesgo de infección por VIH existe tanto para el que penetra como para el que es penetrado, aunque es mayor para el segundo, y aumenta con la presencia de lesiones genitales e ITS.

Si tienes una penetración anal, receptiva o insertiva, con un hombre del que desconoces su estado serológico con respecto al VIH o sois una pareja serodiscordante (uno positivo y otro negativo al VIH), usa correctamente un preservativo (desde el principio de la penetración) junto a un lubricante no graso (soluble en agua). Los lubricantes grasos (cremas corporales, vaselina, mantequilla, etc.) dañan el preservativo y podría romperse.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA/ITS  
Teléfonos de información gratuita: 900 601 601 / 900 111 000  
[www.msc.es](http://www.msc.es)



---

---

---

---



Con la colaboración de  
**020**



FEDERACIÓN **TRIANGULO**  
Por la igualdad social de gays y lesbianas



Foto: AFP / Contrasto - Getty Images

**Disfrútalo**



**Nosotros disfrutamos seguros  
tú decides.**