

PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN (PPE)

La PPE consiste en un tratamiento con fármacos antirretrovirales después de una posible exposición al VIH, por ejemplo, haber sido penetrado con eyaculación por un hombre VIH positivo sin condón o con rotura del mismo.

Estos fármacos sólo deben tomarse de forma excepcional una vez que médico y paciente lo hayan decidido conjuntamente valorando los riesgos y beneficios. Son gratuitos y se dan en el hospital. Este tratamiento dura 28 días, no garantiza que la infección no se produzca y puede tener riesgos y efectos secundarios para la salud. Debe iniciarse lo antes posible y siempre antes de 72 horas tras la exposición.

La PPE sólo se aconseja en personas con una exposición de riesgo esporádica y excepcional. La PPE está desaconsejada cuando se tienen prácticas de riesgo repetidas.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA/ITS
Teléfonos de información gratuita: 900 601 601 / 900 111 000
www.msc.es





Con la colaboración de:
zero
www.zero.es



FUNDACIÓN TRIÁNGULO
TEL: 0522022100 / 04 621 11 660008





Disfrútalo

**Nosotros disfrutamos seguros
tú decides.**