

EL SIDA NO SE CURA

Si tienes una penetración anal, receptiva o insertiva, con un hombre del que desconoces su estado serológico con respecto al VIH o sois una pareja serodiscordante (uno positivo y otro negativo al VIH), usa correctamente un preservativo (desde el principio de la penetración) junto a un lubricante no graso (soluble en agua). Los lubricantes grasos (cremas corporales, vaselina, mantequilla, etc.) dañan el preservativo y podría romperse.

Para no infectarte por el VIH durante una felación, podéis usar un preservativo o evitar la eyacuación en la boca.

Es importante que te hagas la prueba del VIH/sida si tus prácticas sexuales no han sido seguras o si quieres dejar de usar el preservativo con tu pareja siempre que ambos seáis VIH negativos.

La profilaxis post exposición consiste en un tratamiento con fármacos antiretrovirales después de una posible exposición al VIH, por ejemplo, haber sido penetrado con eyacuación por un hombre VIH positivo sin condón o con rotura del mismo. Este tratamiento está desaconsejado cuando las prácticas de riesgo para el VIH son repetidas.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA/ITS
Teléfonos de información gratuita: 900 601 601 / 900 111 000
www.msc.es





Disfrútalo

**Nosotros disfrutamos seguros
tú decides.**