

## A SIDA NON SE CURA

Se tes unha penetración anal, receptiva ou insertiva, cun home do que descoñeces o seu estado serolóxico con respecto ao VIH ou sodes unha parella serodiscordante (un positivo e outro negativo ao VIH), usa correctamente un preservativo (desde o principio da penetración) xunto a un lubricante non graxo (soluble en auga). Os lubricantes graxos (cremas corporais, vaselina, manteiga, etc.) danan o preservativo e podería romperse.

Para non infectáreste polo VIH durante unha felación, podedes usar un preservativo ou evitades a exacuación na boca.

É importante que che fagas a proba do VIH/SIDA se as túas prácticas sexuais non foron seguras ou se queres deixar de usar o preservativo coa túa parella, sempre que ambos sexades VIH negativos. .

A profilaxe post exposición consiste nun tratamento con fármacos antiretrovirais logo dunha posible exposición ao VIH, por exemplo, ser penetrado con exacuación por un home VIH positivo sen condón ou con rotura do mesmo. Este tratamento está desaconsellado cando as prácticas de risco para o VIH son repetidas.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DO VIH/SIDA/ITS  
Teléfonos de información gratuita: 900 601 601 / 900 111 000  
[www.msc.es](http://www.msc.es)



---

---

---

---



Con la colaboración de:  
**zero**  
UNA SOLA VOZ





**Gózaio**

**Nós gozamos seguros  
ti decides.**