

## LA SIDA NO ES CURA

Si tens una penetració anal, receptiva o insertiva, amb un home del qual desconeixes el seu estat serològic respecte al VIH o sou una parella serodiscordant (un positiu i un altre negatiu al VIH), usa correctament un preservatiu (des del principi de la penetració) junt amb un lubricant no gras (soluble en aigua). Els lubricants grassos (cremes corporals, vaselina, mantega, etc.) danyen el preservatiu i podria trencar-se.

Per a no infectar-te pel VIH durant una fel·lació, podeu usar un preservatiu o evitar l'ejaculació en la boca.

És important que et faces la prova del VIH/sida si les teues pràctiques sexuals no han sigut segures o si vols deixar d'usar el preservatiu amb la teua parella sempre que ambdós sigueu VIH negatius.

La profilaxi post exposició consistix en un tractament amb fàrmacs antiretrovirals després d'una possible exposició al VIH, per exemple haver sigut penetrat amb ejaculació per un home VIH positiu sense condó o amb ruptura del mateix. Este tractament està desaconsellat quan les pràctiques de risc per al VIH són repetides.

CAMPANYA DE PREVENCIÓ DEL VIH/SIDA/ITS  
Teléfono d'informació gratuïta: 900 601 601 / 900 111 000  
[www.mscc.es](http://www.mscc.es)



---

---

---

---



Con la colaboración de:



**Disfrúta-ho**

**Nosaltres disfrutem segurs  
tu decidixes.**